



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 08-11-20018063

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 7 du 19 Mai 1999
Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

CEREALES

La plupart des cultures sont en début floraison, apparition des étamines.

A ce stade les céréales sont sensibles aux Fusarioses et en particulier pour notre région au groupe *F. roseum*; les conditions météo actuelles augmentent ce risque; de l'humidité et des températures douces sur la floraison sont favorables à leur apparition; les rendements s'en trouvent affectés ainsi que la qualité du grain par les mycotoxines émises.

Respectez les doses d'emploi d'autant que les spécialités homologuées n'ont jamais une efficacité totale; utilisez

HORIZON	1 l/ha
SOLEIL	1.2 l

La Rouille brune n'a pas connu l'évolution habituelle; des températures souvent fraîches et de fortes pluies ont freiné par moment son explosion; la protection indispensable et conseillée sur la F1 étalée est encore bien opérationnelle et assure le relais avec l'application de début floraison.

L'Oïdium est peu actif, actuellement lessivé par les nombreuses pluies.

La Septoriose est par contre beaucoup plus présente cette année mais également contrôlée par les traitements effectués; elle s'observe au niveau F3 et plus rarement sur F2; par contre sur les feuilles supérieures de nombreuses manifestations physiologiques sont visibles, petites nécroses ressemblant à des tâches de septoriose.

La Rouille jaune est toujours présente principalement sur Acalou; les interventions réalisées ont stoppé son évolution.

Les Pucerons sont encore peu nombreux mais quelques colonies sont visibles; une protection systématique n'est pas forcément utile; surveillez vos parcelles et intervenez si vous notez le seuil de 50 % d'épis colonisés par au moins un puceron; si nécessaire utilisez:

STATUS	1 l/ha
KARATE K	1 l
BAYTHROID	0.3 l
TALSTAR	0.05 l
DECIS	0.25 l

POIS

Ces cultures sont encore en floraison. Les conditions météo actuelles sont très favorables au développement des maladies, Anthracnoses et Botrytis; ce dernier se développe sur les jeunes gousses, sur lesquelles les pétales des fleurs restent collés par l'humidité à leur chute.

Utilisez: **CICERO** 2 l/ha

MAORI 2 l (spécialité à préférer vis à vis du Botrytis)

Les Pucerons sont présents dans les boutons floraux; utilisez:

BEST	1.25 l/ha
KARATE K	1.25 l
SERK EC	1.5 l

Couverture du risque bruches:

BAYTHROID	0.6 l
TALSTAR	0.2 l

TOURNESOL

Les conditions météo actuelles sont favorables aux maladies; le suivi du Phomopsis par la modélisation indique des contaminations possibles qui pourront se traduire par des symptômes cotylédonaire sur variétés sensibles.

Du Mildiou peut également se manifester sur les semis précoces.

► **CEREALES:**
Traitement début
floraison contre
Fusarioses
Insecticide éventuel

► **POIS:** renouvelez
la protection
fongicide-
insecticide

DRAF
Service Régional de la
protection des
Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER
CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles de Languedoc
Roussillon
Directeur gérant:
M.FREYDIER
Publication périodique
C.P.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582